





ФАМОКС, ВДГ

-  250 г/кг фамоксадон + 250 г/кг цимоксанил
-  водно-диспергируемые гранулы



Для борьбы с фитофторозом
и альтернариозом на томатах и картофеле,
а также с ложной мучнистой росой на луке



117452 Россия Москва, Симферопольский бульвар, д. 29, к. 8
+7 (495) 287 85 36 | agruskhim.ru | info@s-ah.ru



Преимущества:

- ✓ Высокая эффективность и быстрое действие против самых вредоносных заболеваний на томате, картофеле и луке;
- ✓ Выраженное профилактическое и лечебное действие против альтернариоза и фитофтороза;
- ✓ Технологичная и удобная для применения форма препарата;
- ✓ Работает в любую погоду;
- ✓ Защищает новый прирост.

Регламент применения:

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата л/га	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	6 г/10 л воды	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, второе – бутонизация, третье – в конце цветения, четвертое – рост ягод и клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м ²	15(4)
Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз		Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м ²	14(4)
Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	12 г/10 л воды	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м ²	21(3)

Приготовление раствора:

10 литров рабочего раствора:



Срок годности: 5 лет